



COMPOSITION

Each ml contains Tilmicosin phosphate 250 mg.

INDICATION

It is indicated to poultry for the treatment of Respiratory diseases associated with *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Pasteurella multocida*.

DOSAGE & ADMINISTRATION

3 ml/10 Lit of drinking water for 5-7 days or prescribed by registered veterinary doctors.

CONTRAINDICATION

The drug is contraindicated in poultry hypersensitive to active ingredient.

SIDE EFFECTS

There is no side effect at the recommended dosage.

DRUG INTERACTION

Should not be taken at the same time with tetracycline because it interferes with the absorption & effectiveness of this medication.

STORAGE

Store below 25° C, protect from light. Keep out of the reach of the children.

PACKAGE QUANTITIES

100 ml & 500 ml.

For veterinary use only.

To be dispensed only by or on the prescription of a registered veterinary doctor



2000017/11



উপাদান

প্রতি মি.লি. এ রয়েছে টিলমিকোসিন ফসফেট ২৫০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা

এটি পোস্তির শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত রোগের (মাইকোপ্লাজমা গ্যালিসেপ্টিকাম, মাইকোপ্লাজমা সাইনোভি ও পাস্চুরেলা মালটোসিডা) চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি

প্রতি ১০ লিটার খাবার পানিতে ৩ মি. লি. করে ৫-৭ দিন অথবা রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

প্রতিনির্দেশনা

এতে ব্যবহৃত সক্রিয় উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল পোস্তিতে ব্যবহার করা যাবেনা।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

নির্দেশিত মাত্রায় এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।

ড্রাগ ইন্টারেকশন

ট্রেটোসাইক্লিন দ্বারা চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ এটি ট্রেটোসাইক্লিনের শোষণ ও কার্যকারিতাকে বাধা দেয়।

সংরক্ষণ

২৫° সে. তাপমাত্রার নিচে সংরক্ষণ করুন এবং আলো থেকে দূরে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

১০০ মি.লি. এবং ৫০০ মি.লি.।

কেবলমাত্র পশু-পাখি চিকিৎসায় ব্যবহার্য।

শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শে ব্যবহার্য।



স্কয়ার
ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
এগ্রোভেট ডিভিশন
পাবনা, বাংলাদেশ